

Tabela 1: Bolezenska stanja in možna uporaba PainSolv naprave

Stanje	Kratek opis	Nastavitev	Priporočena uporaba
Ahilova peta - Bursitis	Bolečina okrog Ahilove pete, kjer se vname bursea	PAIN	Napravo uporabite direktno na mestu bolečine, na vsako strani pete posebej
Akutna bolečina	Akutna bolečina je tista, ki nastopi nenadoma zaradi poškodbe ali kar tako	PAIN	Napravo uporabite direktno na mesto bolečine, lahko jo uporabite kolikokrat hočete, ni omejitve
Angina	Bolečina v predelu srca, ki nastane zaradi pomanjkljivega pretoka krvi v/iz srca		Pred uporabo se posvetujte s svojim zdravnikom. Zdravnik naj prvo postavi pravo diagnozo
Bolečina v gležnju	Bolečina v in okrog gležnja	PAIN	Napravo uporabite direktno na mestu bolečine in okrog gležnja, večkrat
Ankilozni spondilitis	Kronično vnetje predela hrbtenice	PAIN	Za pomoč prosite nekoga, ki vam bo zjutraj, opoldne in zvečer tretiral zgornji, srednji in spodnji del hrbtenice
Arahnoiditis	Vneta membrana okrog hrbtenjače		Pred uporabo se posvetujte s svojim zdravnikom. Zdravnik naj prvo postavi pravo diagnozo
Bolečine v roki	Bolečine v mišicah ali zglobu	PAIN	Napravo uporabite direktno na mestu bolečine, večkrat dnevno
Artritis	Osteoartritis- izraba kosti in sklepov, revmatoidini artritis- vnete membrane okrog in med zglobi	PAIN	Napravo uporabite direktno na mestu bolečine, večkrat dnevno
Bolečine v hrbtu	Bolečine v mišicah hrbta	PAIN	Za pomoč prosite nekoga, ki vam bo zjutraj, opoldne in zvečer tretiral zgornji, srednji in spodnji del hrbtenice
Bakerjeva cista	Natekanje, ki ga povzroča tekočina iz kolenskega sklepa; pritiska na zadnjo stran kolena	WOUND	Napravo uporabite direktno na mestu natekanja, večkrat dnevno
Bicipitalni tendonitis	Bolečine v bicepsu in ramenih	PAIN	Napravo uporabite direktno na mestu bolečine, čim večkrat dnevno. Lahko pa jo uporabite tudi od spredaj - pulzni valovi prodirajo globoko skozi tkivo
Brahialni plexus	Bolečina, ki se preko živca iz hrbtenice, skozi vrat razširi pod pazduho	PAIN	Če sami dosežete mesto bolečine, se tam tretirajte sami, drugače zaprosite nekoga, ki vam bo zjutraj, opoldne in zvečer tretiral zgornji, srednji in spodnji del hrbtenice
Bunion	Oteklina, bolečina v palcu noge	WOUND	Napravo uporabite na najbolj zateklem delu palca, večkrat dnevno
Bursitis	kronično vnetje burze z odlaganjem kalcijevih soli	PAIN	Napravo uporabite na najbolj zateklem delu kolena ali komolca, večkrat dnevno
Sindrom karpalnega tunela Kavzalgija	Živec podlakta je ujet ali stisnjen v zapestju Poškodba živca, pekoč občutek	PAIN WOUND	Napravo uporabite direktno na mestu bolečine, večkrat dnevno Napravo uporabite direktno na mestu bolečine, večkrat dnevno

Stanje	Kratek opis	Nastavitev	Priporočena uporaba
Sindrom centralne bolečine	Bolečina, ki jo povzroči poškodba centralnega živčnega sistema: lahko peče, trga, trenutno zelo zaboli		Pred uporabo se posvetujte s svojim zdravnikom. Zdravnik naj prvo postavi pravo diagnozo
Pritisk v vratu	Pritisnjeno tkivo okrog hrbtenice, povzroči glavobole ali otrdelost vratu ali zadnjega dela glave	PAIN	Napravo uporabite na vrhu ramen takoj zraven vratu in glave, večkrat dnevno
Bolečina v prsnem košu	Otrdelost hrustanca, ki povezuje rebra s prsno kostjo	PAIN	Napravo uporabite na mestu bolečine dvakrat dnevno. Če se bolečina pojavlja na obeh straneh, tretirajte vsako stran posebej
Bolečine po cistektomiji	Stalne bolečine po operativnem posegu na mehurju	WOUND	Napravo uporabite na mestu bolečine, večkrat dnevno
Hondromalacija pogačice	Mehčanje in degeneracija hrustanca	WOUND	Napravo uporabite na področju neugodja, večkrat dnevno
Sindrom kronične utrujenosti	Kronična utrujenost, bolečine v mišicah, zglobeh, slab spanec, pomanjkanje koncentracije, spomina	STRESS	Napravo uporabite na področju solarnega plexusa, večkrat dnevno, najmanj 14 dni zaporedoma: lahko tudi na notranji strani obeh zapestij
Kronična bolečina	Bolečina, ki ne zgine in je že dalj časa prisotna	PAIN	Napravo uporabite na mestu bolečine, večkrat dnevno
Slaba cirkulacija	Premajhen pretok krvi v določene predele telesa	STRESS	Napravo uporabite na področju neugodja, večkrat dnevno
Klusterski glavoboli	Bolečina se pojavi nenadoma, v zaporedjih, običajno vsak dan v istem času, okrog oči ali senc, lahko se razširi po obrazu in vratu	PAIN	Napravo uporabite ne sencih in tudi pri lobanjskem dnu, večkrat dnevno, najmanj 7 dni
Sesedanje vretenc	Zaradi osteoporoze, gostota kosti se manjša		Pred uporabo se posvetujte s svojim zdravnikom. Zdravnik naj prvo postavi pravo diagnozo
Sindrom predela noge	Natekanje, običajno v spodnjem delu noge, pritisk na mišice, živec ali žilo; močna bolečina, ki ne zgine niti z analgetiki, nevarnost amputacije	WOUND PAIN	Uporabite oba načina na mestu neugodja, večkrat dnevno, najmanj 7 dni
Kronova bolezen	Vnetja in razjede na prebavnem traktu		Pred uporabo se posvetujte s svojim zdravnikom. Zdravnik naj prvo postavi pravo diagnozo
Skolioza	Bolečine v predelu ukrivljenosti hrbtenice	PAIN	Če sami dosežete mesto bolečine, se tam tretirajte sami, drugače zaprosite nekoga, ki vam bo zjutraj, opoldne in zvečer tretiral zgornji, srednji in spodnji del hrbtenice
Degenerativni artritis	Izguba hrustanca v sklepih, bolečine v sklepih	WOUND	Napravo uporabite na področju neugodja, večkrat dnevno
Vretenca	Degeneracija vretenc, hernia, ukleščen živec, bolečine vzdolž noge	WOUND	Napravo uporabite na mestu bolečine, lahko večkrat v rednih intervalih
Bolečine v ušesu – Otitis Media	Resne bolečine v ušesu, ki jih povzročajo infekcije. Najbolj pogoste okvare sluha pri otrocih, nastopijo pozimi ali spomladi		Pred uporabo se posvetujte s svojim zdravnikom. Zdravnik naj prvo postavi pravo diagnozo

Stanje	Kratek opis	Nastavitev	Priporočena uporaba
Bolečina v komolcu	Epicondilitis, Tendonitis, vnetje sklepa, teniški komolec	PAIN	Napravo uporabite na mestu bolečine, lahko večkrat v rednih intervalih, najmanj dvakrat dnevno
Erthyrimelalgia	Rdeča ali roza obarvani vneti deli telesa kot so kolena, obraz, ušesa, stopala, včasih natekli ali vroči na otip, pekoča bolečina	WOUND	Napravo uporabite na področju največjega neugodja in nato okrog in vzdolž tega področja. Napravo uporabite čim večkrat
Boleče oko	Bolečino povzroča visok pritisk ali kak drug vzrok		Pred uporabo se posvetujte s svojim zdravnikom. Zdravnik naj prvo postavi pravo diagnozo
Fasetni sindrom	Običajno kronična bolečina povezana z degeneracijo vretenca	PAIN	Napravo uporabite na mestu največje bolečine in nato okrog in vzdolž: Napravo uporabite večkrat, kolikor je pač potrebno
Fibroidi	Mišična vlakna, ki rastejo v maternici, na truhuhu, nekaterim povroča močne bolečine	PAIN WOUND	Napravo uporabite zaporedoma na spodnjem delu abdomena v načinu PAIN in nato v načinu WOUND zjutraj in zvečer
Fibromyalgia	Žareča bolečina, podobna prehladni bolečini v mišicah in ligamentih, kronična bolečina, vendar brez vnetja	PAIN	Napravo uporabite enkrat na vsakem področju največje bolečine – običajno je takih področij več- čim večkrat v rednih intervalih
Bolečine v stopalih, nogah	Povzročajo jih različna stanja, v meso rastoči nohti, vnetje živcev med tretjim in četrtem prstom, na stopalu, bursitis, ravna stopala, žulji, itd.	PAIN WOUND	Napravo uporabite na področju največje bolečine, pa tudi okrog, na drugi strani stopala, na žuljih in vraščenem nohtu v načinu PAIN in WOUND najmanj dvakrat dnevno
Zlomi	Bolečine pri zlomih, poškodbah, frakturah, oteklinah okrog poškodovanih kosti, itd		Pred uporabo se posvetujte s svojim zdravnikom. Zdravnik naj prvo postavi pravo diagnozo
Neobčutljivo rame (frozen shoulder)	Povzroča ga vnetje, lahko tudi krčenje kapsule, ki obkroža zglob rame	PAIN	Napravo uporabite spredaj, zadaj in zgoraj ramena, večkrat
Putika	Bolečine v sklepih zaradi prevelike količine sečne kisline, ki se ne odvaja		Pred uporabo se posvetujte s svojim zdravnikom. Zdravnik naj prvo postavi pravo diagnozo
Bolečina v dimljah	Poškodba pritezni mišic	WOUND	Napravo uporabite na mestu največje bolečine in nato okrog in vzdolž: napravo uporabite večkrat, po potrebi
Glavobol	Srednje močna do močna bolečina v predelu glave, zadaj na vratu. Običajno ni resna bolečina, lahko jo omilimo z analgetiki	PAIN	Napravo uporabite na obeh sencah in tudi na dnu lobanje. Napravo uporabite večkrat, po potrebi.
Pekoča zgaga	Refluks, povroča jo želodčna kislina, pekoč občutek se lahko pojavi tudi v vratu in grlu	STRESS	Napravo uporabite v zgornjem predelu prsnega koša večkrat. Če ne mine, se posvetujte s svojim zdravnikom
Bolečina v peti	Pojavi se zaradi preobremenitve pete, različni vzroki	PAIN	Napravo uporabite direktno na mestu bolečine, lahko pa tudi zadaj na peti, najmanj dvakrat dnevno
Hernia	Različne hernije	PAIN	Napravo uporabite direktno na mestu bolečine, najmanj dvakrat dnevno

Stanje	Kratek opis	Nastavitev	Priporočena uporaba
Herpes Zoster	Boleča infekcija, ki jo povzroča virus herpes	WOUND	Namerite napravo na mesto vnetja in bolečine, vendar se pri tretiranju ne dotikajte obolelega področja. Uporabite LED diodo za usmerjanje delovanja naprave.
Bolečine v kolku	Bolečina znotraj ali okrog kolka	OAIN	Napravo uporabite na mestu bolečine, večkrat, najmanj dvakrat dnevno; če se bolečina selina druge dele, tretirajte posebej tudi ta področja.
Infekcija	Povzroča jo bakterija	STRESS	Napravo uporabite v področju solarnega plexusa
Poškodba ali travma	Pri nesreči ali udarcu	PAIN WOUND	Napravo uporabite direktno na mestu bolečine, večkrat, najmanj dvakrat dnevno, če je rana, uporabite tudi način WOUND
Nespečnost	Povzroča jo lahko stress, depresija, itd	STRESS	Napravo uporabite v predelu solarnega plexusa ali na notranji strani zapestja
Bolečina med rebri	Povzroča jo vnetje medrebrnega živca, ki poteka vzdolž rebra		Pred uporabo se posvetujte s svojim zdravnikom. Zdravnik naj prvo postavi pravo diagnozo
Prekinjen dotok krvi	Ni dovolj krvi v mišicah in zato premalo kisika. To se lahko zgodi v mečih ali stegnu	STRESS	Napravo uporabite na zadnji strani kolena, tudi na stegnu, vsako stran posebej, večkrat dnevno
IBS	Abdominalne bolečine, krči, driska	PAIN STRESS	Napravo uporabite na področju nelagodja, bolečine z načinom PAIN ali na področju solarnega plexusa z načinom STRESS, lahko večkrat dnevno
Burzitis	Vnetje tekočine, ki zapolnjuje burso, ob vsakem sklepu jih je najmanj 160	WOUND	Napravo uporabite na najbolj nateklem predelu, trikrat dnevno
Bolečine v čeljusti	Bolečina v mišicah, ki kontrolirajo žvečenje	PAIN	Napravo uporabite na sklepem predelu čeljusti pred ušesom, dvakrat dnevno
Laminektomija	Operativna odstranitev vretenčnega loka in vretenčnih izrastkov	STRESS	Napravo uporabite na vrhu ramena, kjer se stika z vratom, dvakrat dnevno obe strani
Teniški komolec	Bolečina na zunanji strani komolca, ki se širi navzdol po roki	PAIN	Napravo uporabite na mestu bolečine na zunanji strani komolca in tik pod njim, dvakrat dnevno
Bolečine v nogi	Bolečina nastopi zaradi različnih vzrokov: mišični krči, pomanjkanje mineralov Na, Mg, K, Ca v krvi, tendonitis, krvni strdki, tromboza, osteolyelitis, artritis, poškodba živcev, krčne žile	PAIN	Napravo uporabite na vseh mestih bolečine posebej, najmanj dvakrat dnevno
Boleči ligamenti	Nategnjena ali natrgana mišica	WOUND	Napravo uporabite na mestu bolečine, trikrat dnevno. Proces celjenja lahko traja tudi do 4 tedne

Stanje	Kratek opis	Nastavitev	Priporočena uporaba
Ledvene bolečine	Vzrok so običajno ledvični kamni, lahko pa so tudi v sečevodu	PAIN	Napravo uporabite v ledvenem področju na hrbtu, pa tudi v področju dimelj, trikrat dnevno
Bolečine v spodnjem delu hrbta	Razlogi so lahko različni, od diskovne hernije do obolelih organov, ukleščen živec, itd	PAIN	Napravo uporabite na mestu bolečine zadaj in po možnosti tudi spredaj, najmanj dvakrat dnevno
Lumbago	Bolečina v lumbalnem delu hrbta	PAIN	Napravo uporabite na spodnjem delu hrbtenice, na vsaki zadnjici, najmanj trikrat dnevno
Prolapsus - lumbalni	Zdrs vretenca	PAIN	Napravo uporabite v predelu bolečine na vsaki strani hrbtenice, najmanj trikrat dnevno
Lumbalna spondiloza	Degenerativne spremembe na hrbtenici, sesedanje vretenc	PAIN	Napravo uporabite v predelu bolečine na vsaki strani hrbtenice, najmanj trikrat dnevno
Mastektomijska bolečina	Vzrok je lahko poškodovan živec v roki	WOUND	Napravo uporabite na mestu bolečine ali poškodbe blizu komolca ali pod njim, najmanj trikrat dnevno
Mialgični encefalomyelitis	Poznana tudi pod imenom sindrom kronične utrujenosti, oboleli so lahko živci, oslabeled imunski sistem	STRESS	Napravo uporabite v predelu solarnega plexusa, lahko tudi na notranji strani pesti, najmanj dvakrat dnevno - vsako stran posebej.
Parestetična meralgija	Zbadanje, pekoča bolečina, odrevenelost stegna. Koža je lahko občutljiva na dotik	PAIN	Napravo uporabite na zgornjem delu stegna, lahko pa tudi na notranjem predelu, najmanj dvakrat dnevno
Migrene	Močni glavoboli	STRESS	Napravo uporabite na sencah in tudi zadaj na dnu lobanje, čim večkrat dnevno
Mortonova metatarsalgija	Ponavljajoče travme stopala, konci živcev so ujeti	PAIN	Napravo uporabite na področju blazinice stopala, pa tudi na vrhu stopala, najmanj dvakrat dnevno
Poškodba mišice	Pretegnjena ali kako drugače poškodovana mišica	WOUND	Napravo uporabite na mestu poškodbe, najmanj trikrat dnevno
Neuropatija	Poškodbe živcev zaradi diabetesa	PAIN	Napravo uporabite na mestu bolečine, najmanj dvakrat dnevno
Nočni krči	Mišični krči, ki lahko trajajo tudi do 10 minut	PAIN	Napravo uporabite na mestu bolečine najmanj dvakrat dnevno najmanj en teden
Ezofagitis	Pekoča zgaga, refluks v predelu ezofagitisa	STRESS	Napravo uporabite na področju solarnega plexusa enkrat dnevno
Osteoartritis	Vnetje sklepov, poškodovan hrustanec	PAIN	Napravo uporabite na mestu bolečine najmanj dvakrat dnevno
Osteoporoza	Zmanjševanje kostnine		Pred uporabo se posvetujte s svojim zdravnikom. Zdravnik naj prvo postavi pravo diagnozo
Para tendonitis	Tendonitis stopala, poškodba	PAIN	Napravo uporabite na vrhu stopala najmanj dvakrat dnevno
Bolečina medenice	Lahko je kronična	PAIN	Napravo uporabite na obeh straneh abdomena blizu kolkov, zjutraj in zvečer

Stanje	Kratek opis	Nastavitev	Priporočena uporaba
RSDS - refleksno simpatično pogojena mišična distrofija	Mišična in kostna atrofija zaradi otrdelosti ramenskega sklepa; prim. sindrom rame in roke; tudi kavzalgija, občutek pekoče bolečine, natekanje, nekontrolirani impulzi	PAIN	Napravo uporabite na mestu bolečine, čim večkrat
Nemirne noge	Nevrološka nepravilnost, nekontrolirana potreba po premikanju noge	STRESS	Napravo uporabite na zunanji strani kolka in tudi na zunanji strani stegna, trikrat dnevno, enkrat pred spanjem
Revmatoidni arthritus	Vnetje sklepov, členkov, zapestja, natekanje členkov, negibljivost		Pred uporabo se posvetujte s svojim zdravnikom. Zdravnik naj prvo postavi pravo diagnozo
Boleče rebro	Rebro je lahko nalomljeno ali kako drugače poškodovano, lahko je vneta mišica. Vnetje rebra ali hrustanca ob njem se imenuje Costochondritis. Vnetje poprsnice – Plevritis- povzroča podobno bolečino	PAIN	Napravo uporabite na mestu bolečine, čim večkrat
Vrtljiva mošnja (Rotator cuff)	Kronična bolečina, ki nastopi pri najmanj eni izmed štirih ramenskih mišic (supraspinatus, infraspinatus, teres minor, subscapularis)	PAIN	Napravo uporabite na vrhu in spredaj ramena pri stičišču z vratom na vsaki strani najmanj dvakrat dnevno. Po možnosti tretirajte tudi zadnji del ramena.
Sakralizacija	Bolečina spodnjega dela hrbtenice, kjer vretence L5 pritiska na križnico, ki nosi vso težo in gibanje telesa	PAIN	Napravo uporabite na vsaki strani hrbtenice blizu mesta bolečine trikrat dnevno
Sakralno sklepna bolečina	Blaga do močna bolečina spodnjega dela hrbtenice, bolečina v zadnjici globoko v medeničnem predelu, ki se širi od kolka vzdolž noge	PAIN	Napravo uporabite na vsaki strani hrbtenice blizu mesta bolečine trikrat dnevno
Išias	Močna bolečina, ki se začne v spodnjem predelu hrbtenice in potuje vzdolž noge	PAIN	Napravo uporabite na vsaki strani hrbtenice blizu mesta bolečine, na zunanji strani stegna, meč in na vrhu stopala trikrat dnevno
Sinusitis	Bakterijska infekcija nosne votline	WOUND	Napravo uporabite na obeh straneh lica blizu nosu najmanj dvakrat dnevno
Spinalna stenoza	Zoženje spinalnega kanala povzroča pritisk na živce, bolečina lahko povzroča slabost in zbadanje	PAIN	Napravo uporabite na obeh straneh hrbtenice blizu mesta bolečine najmanj trikrat dnevno
Spondilolisteza	Vretence se pomakne naprej, lahko pri poškodbi - pritisk na L5 vretence, bolečina se razteza ob hrbtenici – boleč občutek zategnjene mišice		Pred uporabo se posvetujte s svojim zdravnikom. Naj zdravnik prvo postavi pravo diagnozo
Spondiloza	Izrastki znotraj vretenc, ali mineralni depoziti med vretenci	PAIN	Napravo uporabite na obeh straneh hrbtenice blizu mesta bolečine najmanj trikrat dnevno

Stanje	Kratek opis	Nastavitev	Priporočena uporaba
Športne poškodbe	Poškodbe mišic, kosti, hrbtenice	PAIN	Napravo uporabite direktno na mestu bolečine čim večkrat
Otrdelost	Otrdelost sklepov, ki jih povzročata artitisa, lahko tudi otrdelost mišic zaradi prevelikega napora	STRESS	Napravo uporabite direktno na mestu bolečine čim večkrat
Subakromski bursitis	Mišica, ki poteka od vrha lopatice do nadlahtnice; mišica, ki opravlja gibanje metanja in gibanje roke gor-dol in v stran, ob napačnem gibu se lahko zelo poškoduje	PAIN	Napravo uporabite na vrhu in spredaj ramena, kjer se stika z vratom, na vsaki strani posebej, najmanj dvakrat dnevno. Po potrebi tretirajte tudi zadnji del ramena.
Supraspinatus Tendonitis	Vnetje kite, pojavi se nenadoma, čuti se preko celega ramena, blizu stičišča s kostjo	PAIN	Napravo uporabite na vrhu obeh ramen in spredaj, kjer se stika z vratom, dvakrat dnevno. Tretirajte tudi zadnji del ramen
TMJ – disfunkcija čeljustnih mišic	Zglob spodnje čeljusti. Bolečina nastopi ob vsakem gibu čeljusti, včasih čeljust s težavo odpremo, ob straneh lahko obraz nateče	PAIN	Napravo uporabite na mestu bolečine pri zglobov čeljusti na obeh straneh najmanj dvakrat dnevno
Teniški komolec	Povroča ga intenzivno gibanje, vname se povrhnjica sklepa, kosti	PAIN	Napravo uporabite na mestu bolečine na zunanji strani komolca in tudi tik pod komolcem najmanj dvakrat dnevno
Tenzijski glavobol	Bolečina nastopi zaradi stresne situacije ali disfunkcije živčnega sistema, lahko tudi zaradi neravnovesja določenih kemičnih snovi v možganih	PAIN	Napravo uporabite na mestu bolečine na vsaki strani glave in na vratu tik pod lobanjskim dnom, najmanj dvakrat dnevno
Bolečina v modih	Nastopi zaradi poškodbe, lahko so blokirane žilice in kri ne pride v moda, potrebna je takojšnja operacija	PAIN	Napravo uporabite na spodnjem delu možganja in tudi na bazi penisa najmanj trikrat dnevno
Torakalni sindrom	Redka nevšečnost, ki vpliva na živce, ki potekajo od nadlakti do vratu in nazaj. Povzročata oslabelelost in otrdelost mišic	PAIN	Napravo uporabite na obeh ramenskih sklepih in tudi na zapestju, trikrat dnevno
Zobobol	Vse vrste zobobolov, od zobne gnilobe, do vnetja dlesni		Pred uporabo se posvetujte s svojim zdravnikom. Zdravnik naj prvo postavi pravo diagnozo
Tranzverzalen mielitis	Vnetje, ki uničuje mielitis, hrbtne možgane	PAIN	Napravo uporabite na vsaki strani hrbtenice blizu bolečega mesta, trikrat dnevno
Natrgane korenine živcev	Nastopi zaradi travm, poškodb, korenine živcev so pretrgane		Pred uporabo se posvetujte s svojim zdravnikom. Zdravnik naj prvo postavi pravo diagnozo
Trigeminalna nevralgija	Nenadna bolečina v obraznih mišicah, tudi krči. Pekoča ali ostra bolečina lahko traja od par sekund do nekaj minut	PAIN	Napravo lahko držite usmerjeno na področje bolečine tudi do 6mm stran od mesta bolečine. Tretirajte lahko tudi področje čeljusti, vsako stran posebej, dvakrat dnevno

Stanje	Kratek opis	Nastavitev	Priporočena uporaba
Bursitis	Bolečina v kolku, stegnu, zadnjici, povzroča jo vnetje sklepov	PAIN	Napravo uporabite na obeh delih zdanjice in na mestu bolečine, trikrat dnevno
Sindrom dvanajstega rebra	Bolečina je lahko stalna in zbadajoča: povzroči jo rebro, ki se dotika ali prekriža sosednje rebro.	PAIN	Napravo uporabite na zgornjem delu abdomena na boleči strani, trikrat dnevno
Gnojni kolitis	Povzroča kronično bolečino. Črevesna bolezen, ki se pojavlja v intervalih: običajni simptomi so utrujenost, vročina, abdominalna bolečina, vname se notranjost tankega ali debelega črvesa, razvijejo se majhne odprte rane, ki krvavijo, nastaja gnoj in sluz.	PAIN STRESS	Napravo uporabite na mestu bolečine (način PAIN) ali na področju solarnega plexusa (način STRESS), čim večkrat čez dan
Čir pri krčnih žilah	Srbeč, skorjast tip čira, z rdečo gnojno sredino, običajno se pojavi na nogah iznad gležnja, težko se zaceli	PAIN WOUND	Področje tretirajte skozi medicinsko gazo, z napravo se ne dotikajte odprte rane. Začnite z načinom PAIN in in takoj nato z načinom WOUND. Čir tretirajte dvakrat dnevno najmanj 14 dni, nato en teden počakajte in potem ponovite celotni tretman.
Poškodba vratnih vretenc	Povzroči jo nenaden in hiter sunek, lahko ob nesreči	PAIN	Napravo uporabite na vrhu ramena na vsaki strani vratu, najmanj dvakrat dnevno